Hospital Universitario Infanta Elena

Comunidad de Madrid

IV JORNADA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PARA ATENCIÓN PRIMARIA

Salón de actos del Hospital Universitario Infanta Elena
Miércoles 21 de octubre de 2015

Mastitis puerperal

Montserrat González Rodríguez

Esther Pérez Carbajo

Lactancia materna

- En los últimos años la lactancia materna objeto de renovado interés
- Beneficios madre-hijo a medio y largo plazo
- La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, destete gradual hasta los dos años
- Condicionantes laborales y/o falta de información y apoyo.

Introducción

- La mastitis causa de destete precoz. 2ª -3ª semana
- Importante laguna en el conocimiento de las mastitis humanas. Pocos estudios y anticuados
- Contrasta medicina veterinaria. Conocimiento amplio sobre etiología, prevención y manejo. Problema económico de primera magnitud.

Introducción

- Ausencia de diagnóstico etiológico
- Frecuente prescripción de tratamiento inadecuado
- Dilema:
 - a) continuar aguantando los síntomas lo mejor posible, ante la incompreensión incluso de los profesionales
 - b) abandonar la lactancia

Introducción

- Microbiota fisiológica propia: estafilococos, estreptococos y bacterias lácticas (< 2000 bact/ml)
- Mastitis infecciosas: disbiosis microbiana, aumento del agente causal.
- Inflamación y obstrucción conductos
- Sintomatología florida. Único síntoma: dolor intenso, “pinchazos” ,lesiones del pezón
- Infravalorado, infradiagnosticado

Etiología

- Staphylococcus y Streptococcus
 - Coagulasa –negativos
 - Capacidad para formar biopelículas
 - Resistencia a la meticilina
 - Mecanismos de evasión a respuesta inmunitaria
- Levaduras: incidencia muy baja

Tipos de mastitis

- Mastitis aguda
- Absceso mamario
- Mastitis subaguda
- Mastitis subclínica

Mastitis aguda

- Dolor intenso
- Síntomas inflamatorios: enrojecimiento, tumefacción, induración
- Síntomas constitucionales: fiebre, malestar general...
- Staphylococcus aureus
- Frecuencia: 17-27 % (primípara)
- Tratamiento: antibioterapia, sintomático

Absceso mamario

- El tejido mamario reacciona tratando de aislar a las bacterias causantes en una cápsula de tejido conectivo.
- Solo retirar lactancia si bilateral.
- Tratamiento :
 - Drenaje e quirófano
 - Antibioterapia intravenosa

Mastitis subaguda

- Única síntoma: DOLOR LOCAL INTENSO
 - Tipo “pinchazos , como cristales, agujas”
 - Calambres que pueden reflejarse en espalda o brazo
 - Quemazón

Las bacterias se disponen en forma de películas biológicas (biofilms) en el epitelio de los acinos y conductos galactóforos. Si la concentración bacterias rebasa los límites, la luz de los acinos se reduce y aumenta la presión.

Crecimiento de estafilococos coagulasa- negativos (*Saph epidermidis*), estreptococo viridans, *Corynebacterium*)

- Ausencia o leve enrojecimiento
- No afectación sistémica

Mastitis subaguda

- Ocasionalmente síntomas locales: grietas, induración
- Disminución de secreción láctea. La leche sale por 1 o 2 orificios y escurre a gotas
- Lactante más irritable, tirones de pezón
- Infradiagnosticado (no calor ni tumefacción)
- Generan destetes no deseados

Mastitis subclínica

- Etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento similar a la SUBAGUDA. **Sin dolor**
- Falsa sensación de poca producción de leche
- Simplemente : biofilms bacterianos que impiden la correcta secreción
- Diminución del caudal de leche: tomas más largas y frecuentes. Lactante más irritable, tirones de pezón

Diagnóstico

- **Clínico:**
 - Mastitis aguda sintomatología florida
 - Dolor (mastitis subaguda)
 - Escasa producción de leche (mastitis subclínica)
- **Cultivo de la leche:**
 - Expresión manual
 - Primeros 30-45 minutos
 - Refrigeración($<6^{\circ}$) máximo 24 horas o congelar (-20°), cadena de frío

Tratamiento

- Mastitis agudas:
 - Antibiótico:
 - Amoxicilina/ác clavulámico 1000/62.5 mg cada 8 horas 10 días
 - Cloxacilina 500 cada 6 horas 10 días
 - Cefalosporinas
 - Antiinflamatorio:
 - Alternar paracetamol e ibuprofeno
- Absceso mamario:
 - Drenaje en quirófano
 - Antibioterapia

Tratamiento

- Mastitis subagudas y subclínicas:
 - Probiótico (1×10^9 ufc 3 veces al día):
 - Lactobacillus salivarum (90%)
 - Lactobacillus fermentum
 - Lactobacillus reuteri

Probióticos

- Mecanismo de acción:
 - Migrar a la mama desde el intestino
 - Desplazan del sitio de unión a las bacterias patógenas
 - Capacidad para modular el sistema inmune
 - Producción de citoquinas antiinflamatorias

Tratamiento

- Mastitis subagudas y subclínicas
 - Antibióticos si no efectivo:
 - Ciprofloxacino 750 cada 12 horas 7 -10 días
 - Siempre añadir antiinflamatorios

Tipos de mastitis, agentes etiológicos, sintomatología característica y tratamiento empírico propuesto

Tipo	Principales agentes etiológicos	Sintomatología ¹	Tratamiento ²
Agudas ³	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Staphylococcus aureus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Enrojecimiento, aumento de tamaño del pecho • Zonas de induración • Disminución de la secreción de leche • Síntomas similares a la gripe (fiebre, dolores musculares, dolores articulares, escalofríos...) • Abscesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Antibiótico: <ul style="list-style-type: none"> – Amoxicilina/ácido clavulánico (1.000/62,5 mg, cada 8-12 h durante 7-10 días) – Cloxacilina – Cefalosporinas • Antiinflamatorios: <ul style="list-style-type: none"> – Alternar paracetamol e ibuprofeno, 600 mg 2-4 veces/día
Subagudas ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Staphylococcus epidermidis</i> • <i>Streptococcus mitis</i> • <i>Streptococcus salivarius</i> • <i>Rothia</i> spp. • <i>Corynebacterium</i> spp. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor en el pecho (pinchazos, calambres, sensación de quemazón) • Zonas de induración en el interior del pecho • Disminución en la secreción de leche • La leche sale por 1-2 orificios y escurre/gotea • Niños: tomas largas y/o frecuentes • Alternan momentos en los que están relajados con fases en las que hacen un amamantamiento agresivo (tiran del pezón, movimientos característicos de cabeza) 	<ul style="list-style-type: none"> • Probióticos (1 × 10⁹ ufc, 3 veces al día): <ul style="list-style-type: none"> – <i>Lactobacillus salivarius</i> – <i>Lactobacillus fermentum</i> – <i>Lactobacillus reuteri</i> – Otras especies de <i>Lactobacillus</i> (de venta en farmacias) • Antibióticos (en caso de ser ineficaz el tratamiento con probióticos): <ul style="list-style-type: none"> – Ciprofloxacino (750 mg, cada 12 h durante 7-10 días) – Cotrimoxazol • Antiinflamatorios: ibuprofeno 600 mg, 2-4 veces/día
Subclínicas	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Staphylococcus epidermidis</i> • <i>Streptococcus mitis</i> • <i>Streptococcus salivarius</i> • <i>Rothia</i> spp. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de dolor • Resto similar al de las subagudas 	<ul style="list-style-type: none"> • Probióticos (1 × 10⁹ ufc, 3 veces al día): <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lactobacillus salivarius</i> • <i>Lactobacillus fermentum</i> • <i>Lactobacillus reuteri</i> • Otras especies de <i>Lactobacillus</i> (de venta en farmacias)

¹Todos los tipos de mastitis pueden cursar con presencia o ausencia de grietas. ²Siempre es conveniente realizar un cultivo y un antibiograma, por si las cepas causantes de la mastitis fuesen resistentes a los antibióticos propuestos. ³El tratamiento de las mastitis agudas con antibióticos puede conducir a una mastitis subaguda.

⁴Las mastitis subagudas pueden evolucionar a mastitis crónicas o recurrentes.

Candidiasis

- Dolor crónico (pinchazos) sin grandes alteraciones cutáneas. Tratamiento antimicótico, probióticos
- Sobrediagnosticado y mal diagnosticado
- La glándula mamaria no es un ecosistema adecuado.
- Mito: un pequeño porcentaje de casos (5-6%) coexisten con candidiasis oral.
- Ninguna especie

Gracias por su atención